

CASSIT

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СУЛЬФИТАЦИИ

▶ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ (ВИНОДЕЛИИ)

КАССИТ используется при дегоржировании или при дозировании ликёром игристых вин, имеющих заметно выраженные признаки зрелости и/или несколько повышенное содержание железа.

Лимонная кислота в составе препарата **КАССИТ** даёт следующие эффекты:

- образование растворимых комплексов с железом, что таким образом уменьшает риски железного касса;
- обладая сильным кислым вкусом, корректирует в небольшой степени кислотность в вине, когда слишком поздно проводить подкисление винной кислотой.

SO₂ в составе препарата **КАССИТ** имеет те же свойства, как и когда находится в чистом растворе:

- антисептическое действие на дрожжи, бактерии и плесени;
- антикислородное действие для предупреждения окисидного касса, пожелтения и мадеризации вина.

▶ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

КАССИТ применяется при дозировании ликёром игристых вин.

Предусмотренное количество препарата добавляется и смешивается с экспедиционным ликёром перед проведением операции дозирования.

NB: конечная концентрация лимонной кислоты не должна превышать 1 г/л вина.

Проконсультироваться в вашей лаборатории.

▶ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОЗЫ

- 1 - 4 сл [10 - 40 мл] препарата **КАССИТ** на количество ликёра, необходимого для дозирования 100 бутылок игристого вина.

Доза определяется в зависимости от степени стабильности вина при контакте с воздухом, содержания железа и общего SO₂ [проконсультироваться в вашей лаборатории].

▶ РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

- По 1 л, 5 л, 10 л

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении, без посторонних запахов при температуре 5 - 25 °C. Использовать в короткий период времени после вскрытия упаковки.