

ReduCIT™

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ОБРАБОТОК

Препарат на основе цитрата меди.

Разрешённая для применения предельная доза: 8 сл/гл (8 мл/дал) при условии, что содержание меди в обработанном виноматериале (вине) не должно превышать 1 мг/л.

→ ПРИМЕНЕНИЕ В ВИНОДЕЛИИ

ReduCIT™ / РедуЦИТ - энораствор, применяется для предупреждения появления и обработки с целью удаления тонов серосодержащих соединений (тонов редукации / «задушки»).

РедуЦИТ используют в производстве тихих вин и шампанских виноматериалов, а также при дегоржировании игристых вин (классический метод).

→ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Развести препарат в 20-кратном количестве вина перед тем, как добавлять в обрабатываемый объём.

- Тихие вина:

снять с осадка и провести обильную аэрацию при внесении препарата.

Возобновлять операцию до полного исчезновения тонов редукации.

- Шампанские виноматериалы (виноматериалы для производства игристых вин):

добавить РедуЦИТ в тиражную смесь вместе с ликёром и разводкой дрожжей.

- Игристые вина в ходе дегоржирования:

добавить РедуЦИТ в экспедиционный ликёр за несколько часов до проведения операции дозирования.

→ ДОЗИРОВКА

- Тихие вина:

- от 2 до 8 сл/гл (2 - 8 мл/дал).

Примечание: для обработки вина при завершении брожения доза может быть увеличена.

- Шампанские виноматериалы:

- от 2 до 8 сл/гл (2 - 8 мл/дал).

- Экспедиционный ликёр:

- от 1,5 до 3 сл (15 - 30 мл) в объём ликёра для дозирования в расчёте на 100 бутылок вина.

→ РАСФАСОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- 1 л

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре в пределах от 5 до 20°C, защищая от попадания света.

Не подлежит длительному хранению после вскрытия заводской упаковки.