

SULFIVIN A 180

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СУЛЬФИТАЦИИ

Законодательно установленные максимальные дозы в соответствии с приложением 1В регламента ЕС 606/2009

▼ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ (ВИНОДЕЛИИ)

СУЛЬФИВИН А180 - раствор бисульфита аммония [180 г/л].

СУЛЬФИВИН А180 применяется в сезон переработки винограда:

- в сусло: в ёмкость для приёмки сусла в качестве превентивной [профилактической] меры против оксидазного кассса и всех видов микробиальной порчи;
- для красных вин: при загрузке в ёмкость, в процессе дробления, для экстракции и фиксации красящих веществ;

СУЛЬФИВИН А180 обладает следующими свойствами:

- как антисептик препятствует развитию микроорганизмов;
- является селективным фактором для дрожжей, ограничивая распространение нежелательных штаммов;
- действуя в роли антиокислителя, предотвращает оксидазный кассс;
- облегчает экстракцию цвета, способствуя растворению антоцианов, содержащихся в кожице винограда;
- содействует стабилизации цвета в красных винах.

▼ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Введение препарата **СУЛЬФИВИН А180** должно сопровождаться тщательным перемешиванием.

Рекомендуется избегать контакта препарата **СУЛЬФИВИН А180** с металлическими предметами [железо, медь, алюминий].

▼ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОЗЫ

- До 6 сл/л [60 мл/гектолитр] в зависимости от условий винификации

▼ РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

- В канистрах по 6 кг, 11,5 кг и 23 кг
- В контейнерах по 1130 кг

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 10 - 20°C.
Использовать в короткий период времени после вскрытия упаковки.