

# CARBION LIQUIDE

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ОБРАБОТОК

Законодательно установленная доза: 100 г/гл угля в сухой форме или 0,5 л/гл CARBION LIQUIDE. Требуется разрешение на применение препарата. Соблюдать требования действующего законодательства в вашем винодельческом регионе.

**ВНИМАНИЕ:** регламентирующие нормы различаются в зависимости от использования активированного угля для сусле, броющего сусле и вина.

### ↓ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ

**КАРБИОН жидкий** - активированный растительный уголь, применяется для для корректировки цвета [обесцвечивания] сусле и вина с нетипичными оттенками в окраске или с мадерными тонами.

**КАРБИОН жидкий** – водная суспензия [200 г/л] инертного активного угля с очень высокой адсорбционной способностью. Благодаря большой внутренней удельной поверхности [1300 – 1400 м<sup>2</sup>/г] эффективно обесцвечивает окрашенное сусле или вино при переработке красных сортов винограда по белому способу.

Препарат **КАРБИОН жидкий** был специально протестирован для предотвращения отрицательного воздействия на букет вина.

### ↓ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Введение препарата.

**КАРБИОН жидкий** добавляется непосредственно в сусле или вино.

Энергично взболтать содержимое канистры, чтобы получить гомогенную суспензию.

Довести до однородного состояния в ходе перекачивания ёмкости снизу вверх [«ремонтаж»] и последующего тщательного перемешивания.

2. Удаление препарата:

- из сусле: применять **КАРБИОН жидкий** при стекании сусле в лоток в процессе прессования в сочетании с препаратами INOZYME / ИНОЗИМ или INOZYMETERROIR / ИНОЗИМ ТЕРРУАР и удалить после отстаивания в течение 24 часов или центрифугированием;
- из вина: удалить после 48 часов контакта посредством фильтрации или оклейки.

### ↓ ДОЗИРОВКА

Чтобы определить дозу для применения, проконсультируйтесь в вашей лаборатории.

### ↓ РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

• По 10 л

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 5 - 25°C.

После вскрытия упаковки использовать в течение короткого периода времени.

Не применять препарат в открытой таре на следующий год.

### ↓ ЭКВИВАЛЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ СУХАЯ ФОРМА/ЖИДКАЯ ФОРМА

100 г = 50 сл [500 мл]

80 г = 40 сл [400 мл]

60 г = 30 сл [300 мл]

40 г = 20 сл [200 мл]

20 г = 10 сл [100 мл]

**Institut Œnologique de Champagne**

ZI de Mardeuil - Allée de Cumières

BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex France

Тел.: +33 (0)3 26 51 96 00

Факс: +33 (0)3 26 51 02 20

[www.ioc.eu.com](http://www.ioc.eu.com)

Информация, содержащаяся в этом описании представляет данные, которыми мы располагаем на настоящем этапе развития знаний. Это не освобождает пользователей от необходимости принимать меры предосторожности и проводить опытные обработки. Все требования действующих нормативных документов должны быть строго соблюдены.