

INOSTAB G (E 466)

СТАБИЛИЗАЦИЯ ВИНА

Камедь целлюлозы или натрий - карбоксиметилцеллюлоза, КМЦ натриевая соль
Законодательно установленная предельная доза Регламент ЕС n°606/2009: 10 г/гл

↓ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ

ИНОСТАБ Г - препарат карбоксиметилцеллюлозы высокой очистки. Выпускается в гранулированной форме, что обеспечивает более эффективное растворение.

ИНОСТАБ Г замедляет процесс кристаллизации солей винной кислоты [тарtrat кальция и битарtrat калия], препятствуя росту кристаллов.

При использовании в процессе тиража [классический метод производства игристых вин] способствует уменьшению в значительной степени риска несвоевременного выхода газа и образования избыточной пены во время дегоржирования, и как результат - потерю вина и углекислоты [фр. - «gerbage/жербаж»].

Применение **ИНОСТАБ Г** при дегоржирования не является фактором, вызывающим «жербаж».

Эффективность препарата не теряется с течением времени.

↓ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Растворить **ИНОСТАБ Г** в приблизительно 20-кратном объёме тёплой воды, всыпая его при энергичном перемешивании, чтобы избежать образования комков.

Рекомендуется готовить рабочий раствор накануне проведения обработки.

Приготовленный раствор снова развести в 2-кратном количестве вина, предназначенного для обработки.

Полученный раствор добавить в общий объём вина.

В некоторых случаях наблюдаются затруднения при фильтровании. Желательно предварительно делать опытные обработки, чтобы определить, следует ли проводить операцию до или после фильтрации.

↓ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании в красных и розовых винах **ИНОСТАБ Г** может провоцировать потерю цвета и образование небольшого осадка.

Вино, в которое добавляется препарат, должно быть стабильным относительно белкового касса и не подвергаться обработке лизоцимом.

↓ ДОЗИРОВКА

Дозы, применяемые обычно, варьируют от 4 до 10 г/гектолитр вина для обработки [максимальная доза для использования] в зависимости от степени нестабильности против кристаллических помутнений.

↓ РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

• В пакетах по 1 кг, 2,5 кг, 5 кг и в мешках по 20 кг

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 5 - 25°C.

После вскрытия упаковки использовать в течение короткого периода времени.

↓ ПРИМЕЧАНИЯ

ИНОСТАБ Г не оказывает действия на растворённые соли винной кислоты, поэтому IOC не несёт ответственность за возможное присутствие кристаллов в бутылках после проведения этой обработки.

Для того, чтобы гарантировать минимальный риск кристаллизации после розлива в бутылки, настоятельно рекомендуется частичная обработка холодом [или электродиализом] до температуры насыщения 19°C.