

OTACLEAN

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ОБРАБОТОК

Требуется разрешение на применение препарата. Следует соблюдать требования действующего законодательства в вашем винодельческом регионе.

ВНИМАНИЕ: регламентирующие нормы различаются в зависимости от использования активированного угля для сусла, бродящего сусла и вина.

▶ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ

ОТАКЛИН - активированный растительный уголь в гранулированной форме, применяется для удаления посторонних тонов [дезодорирования] в сусле и вине.

ОТАКЛИН – инертный активный уголь с высокой способностью к адсорбции веществ, вызывающих появление определённых дефектов вина, более конкретно - охратоксина А. Проявляет относительно слабое обесцвечивающее действие.

▶ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Введение препарата.

- Развести препарат в 2-3-кратном объёме воды и добавить суспензию в сусло или вино.
- Довести до однородного состояния в ходе перекачивания ёмкости снизу вверх [«ремонтаж»] и последующего тщательного перемешивания.

2. Удаление препарата:

- из сусла: применять **ОТАКЛИН** в сочетании с препаратом INOZYME / ИНОЗИМ и удалить осадок после отстаивания в течение 24 ч или центрифугированием;
- из вина: удалить после 24 часов контакта [не более 48 часов] посредством фильтрации или оклейки.

▶ ДОЗИРОВКА

Чтобы определить дозу для применения, обратитесь в вашу лабораторию или к энологу-консультанту. Поскольку доза зависит от проблемы, которую необходимо корректировать, следует проводить предварительно опытные обработки.

В качестве примера, дозы для обработки вина против охратоксина А варьируют от 20 до 40 г/гЛ. Для коррекции органолептических дефектов [привкус плесени, растительные тона...] используются дозировки от 5 до 20 г/гЛ.

▶ РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

- В пакетах по 1 кг

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 5 - 25°C.

После вскрытия упаковки использовать в течение короткого периода времени.