

REDOXYL

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ОБРАБОТОК

Разрешённая для применения предельная доза: 20 мг/гл при условии, что содержание меди в обработанном вине не должно превышать 1 мг/л.

↓ ПРИМЕНЕНИЕ В ВИНОДЕЛИИ

REDOXYL / РЕДОКСИЛ - энораствор, применяется для предупреждения появления и обработки с целью удаления тонов серосодержащих соединений (тонов редукции / «задушки»).

РЕДОКСИЛ используют в производстве тихих вин и шампанских виноматериалов, а также при проведении операции дегоржирования игристых вин (классический метод).

↓ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Развести препарат в 10-кратном количестве вина перед тем, как добавлять в обрабатываемый объём.

- Тихие вина:

снять с осадка и провести обильную аэрацию при внесении препарата.

Возобновлять операцию до полного исчезновения тонов редукции.

- Шампанские виноматериалы (виноматериалы для производства игристых вин):

добавить **РЕДОКСИЛ** в тиражную смесь вместе с ликёром и разводкой дрожжей.

↓ ДОЗИРОВКА

- Тихие вина:

- от 3 до 8 мг/гл.

Примечание: для обработки вина при завершении брожения доза может быть увеличена.

- Шампанские виноматериалы:

- от 2,5 до 5 мг/гл.

↓ РАСФАСОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- 1 л, 5 л, 10 л

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре в пределах от 5 до 20°C, защищая от попадания света.

Не подлежит длительному хранению после вскрытия заводской упаковки.