

# ReduCIT

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ОБРАБОТОК

Препарат на основе цитрата меди и лимонной кислоты.

Разрешённая для применения предельная доза: 8 сл/гл (8 мл/дал) при условии, что содержание меди в обработанном виноматериале (вине) не должно превышать 1 мг/л.

### ↓ ПРИМЕНЕНИЕ В ВИНОДЕЛИИ

**ReduCIT / РедуЦИТ** - энораствор, применяется для предупреждения появления и обработки с целью удаления тонов серосодержащих соединений (тонов редуции, «задушки»).

**РедуЦИТ** используют в производстве тихих вин и шампанских виноматериалов, а также при дегоржировании игристых вин (классический метод).

### ↓ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Развести препарат в 20-кратном количестве воды перед тем, как добавлять в вино.

- Тихие вина:

снять с осадка и провести обильную аэрацию при внесении препарата.

Возобновлять операцию до полного исчезновения тонов редуции.

- Шампанские виноматериалы (виноматериалы для производства игристых вин):

добавить **РедуЦИТ** при внесении ликёра и дрожжей.

- Игристые вина при проведении операции дегоржирования:

добавить **РедуЦИТ** в экспедиционный ликёр за несколько часов до проведения операции дозирования.

### ↓ ДОЗИРОВКА

- Тихие вина:

- от 2 до 8 сл/гл (2 - 8 мл/дал)

Примечание: для обработки вина при завершении брожения доза может быть увеличена.

- Шампанские виноматериалы:

- от 2 до 8 сл/гл (2 - 8 мл/дал)

- Экспедиционный ликёр:

- от 1,5 до 3 сл (15 - 30 мл) в объём ликёра для дозирования в расчёте на 100 бутылок вина.

### ↓ РАСФАСОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- 1 л

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре в пределах от 5 до 20°C, защищая от попадания света.

Не подлежит длительному хранению после вскрытия заводской упаковки.