

# SULFATE D'AMMONIUM

## ОПТИМИЗАЦИЯ БРОЖЕНИЯ

**Активатор с минеральным азотом**

### ↓ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ

**СУЛЬФАТ АММОНИЯ** представляет собой азотную добавку для сред, обеднённых азотистыми веществами, способствует активированию спиртового брожения. Рекомендуется использовать на стадии после прохождения 1/3 процесса брожения.

### ↓ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Максимальная официально разрешённая доза: 100 г/г/л.

- Обычно применяемые дозы: 10 - 80 г/г/л в зависимости, помимо других факторов, от содержания в сусле ассимилируемого азота, используемого штамма дрожжей, концентрации сахаров для сбраживания и цели получаемого конечного продукта.

При добавлении 10 г/г/л препарата **СУЛЬФАТ АММОНИЯ** привносится около 20 мг/л ассимилируемого аммонийного азота.

При брожении суслу обычно рекомендуется добавлять **СУЛЬФАТ АММОНИЯ** после прохождения 1/3 брожения, а не на его начальном этапе, чтобы избежать образования излишне большой популяции дрожжей.

Если необходимо вносить азот в начале брожения, то желательно в сочетании с органическим или комплексным питанием.

Приготовить суспензию препарата **СУЛЬФАТ АММОНИЯ** в 3-кратном объёме воды. После введения в сусло привести в однородное состояние с помощью перемешивания или перекачивания ёмкости снизу вверх [«ремонтаж»].

### ↓ РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Пакеты по 1 кг, 5 кг

Хранить в сухом месте без посторонних запахов при температуре 5 - 25°C. После вскрытия упаковки продукт не может храниться и должен быть применен в течение короткого времени. Суспензия препарата используется в день её приготовления.