

SULFIVIN A 50

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СУЛЬФИТАЦИИ

Законодательно установленные максимальные дозы в соответствии с приложением 1B регламента ЕС 606/2009

▶ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНОЛОГИИ (ВИНОДЕЛИИ)

СУЛЬФИВИН А50 - раствор бисульфита аммония [50 г/л].

СУЛЬФИВИН А50 применяется в сезон переработки винограда:

- *в сусло*: в ёмкость для приёмки сусла в качестве превентивной [профилактической] меры против оксидазного касса и всех видов микробиальной порчи;
- *для красных вин*: при загрузке в ёмкость, в процессе дробления, для экстракции и фиксации красящих веществ;

СУЛЬФИВИН А50 обладает следующими свойствами:

- как антисептик препятствует развитию микроорганизмов;
- является селективным фактором для дрожжей, ограничивая распространение нежелательных штаммов;
- действуя в роли антиокислителя, предотвращает оксидазный касс;
- облегчает экстракцию цвета, способствуя растворению антоцианов, содержащихся в кожице винограда;
- содействует стабилизации цвета в красных винах.

▶ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Введение препарата **СУЛЬФИВИН А50** должно сопровождаться тщательным перемешиванием.

Рекомендуется избегать контакта препарата **СУЛЬФИВИН А50** с металлическими предметами [железо, медь, алюминий].

▶ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОЗЫ

- До 20 сл/гл [200 мл/гектолитр] в зависимости от условий винификации

▶ РАСФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

- В канистрах по 5 кг, 10,5 кг и 21 кг
- В контейнерах по 1040 кг

Хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении без посторонних запахов при температуре 10 - 20°C.

Использовать в короткий период времени после вскрытия упаковки.