



BACTÉRIE ŒNOLOGIQUE SÉLECTIONNÉE FORMULÉE EN PASTILLES
Oenococcus oeni

INNOVATION

**Une solution simple
pour inoculer
vos barriques**

malotabs™

PASTILLE



*dissolution et
dispersion rapide*



Les bactéries œnologiques sélectionnées pour la fermentation malolactique (FML) sont à présent disponibles sous une forme nouvelle. Malotabs™ est une pastille d'*Oenococcus oeni* sélectionné, spécialement développée pour une utilisation facile dans les barriques, permettant une induction simplifiée de la FML. Malotabs™ assure une dissolution et une dispersion rapides des bactéries, complètes et homogènes sur l'ensemble du volume de la barrique.


Testée et approuvée pour son efficacité, Malotabs™ est disponible pour les vins blancs ou rouges. Malotabs™ participe à l'élaboration de vins frais et fruités avec une bouche équilibrée.



Pour les vins blancs

Propriétés œnologiques et microbiologiques

- Tolérance pH : > 3,2
- Tolérance alcool : < 16 % vol
- Tolérance température : > 16°C
- Tolérance SO₂ : jusqu'à 60 mg/L de SO₂ total
- Bonne implantation
- Cinétique de FML : rapide à modérée
- Faible production d'acidité volatile
- Aucune production d'amines biogènes
- Bactérie cinnamyl esterase-négative : ne produit pas de précurseurs pour la production d'éthylphenols par *Brettanomyces*
- Dégradation très tardive de l'acide citrique : faible production de diacétyl



et les vins rouges



Instructions d'utilisation

Inoculation séquentielle: après fermentation alcoolique

- Ouvrir le sachet et ajouter une pastille par barrique, directement dans le vin (sans réhydratation) après la fin de la fermentation alcoolique. La dissolution de la pastille sera rapide et complète sans nécessité de bâtonner.
- Vérifier l'activité de fermentation malolactique (dégradation de l'acide malique) tous les 2 à 4 jours.
- Stabiliser le vin une fois la FML achevée.

Gammes de températures recommandées:

- Vin blanc : de 16°C à 20°C
- Vin rouge : de 17°C à 25°C

En cas de conditions limitantes (alcool élevé >14,5 % vol ou pH faible < 3,1 ou SO₂ élevé > 45 mg/L) : de 18 à 22°C.

Conditionnement et conservation

Malotabs™ contient 5 pastilles, pour inoculer 5 barriques : 1 pastille / barrique.

- Une fois ouvert, Malotabs™ doit être utilisée immédiatement. Les pastilles non utilisées doivent être replacées dans leur emballage d'origine refermé hermétiquement jusqu'à leur utilisation.
- Le produit peut être conservé pendant 12 mois à 4°C ou 30 mois à -18°C dans son emballage d'origine non ouvert.
- Les emballages non ouverts peuvent être transportés et stockés pendant 2 semaines à température ambiante (< 25°C) sans perte significative de viabilité.



Ce document contient les informations les plus récentes sur la connaissance de nos produits; celles-ci sont donc susceptibles d'évoluer et ne constituent pas une garantie ou un engagement contractuel lié à la vente de ce produit.

DISTRIBUÉ PAR



Malotabs™ a été développé par un expert en tableting

eurotab®
GROUP